THIS WORK WAS FINANCIALLY SUPPORTED IN PART BY THE NIES GOSAT PROJECT, CENTER FOR GLOBAL ENVIRONMENTAL RESEARCH, NATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL STUDIES, JAPAN

RESIDUAL IRRADIANCE SPECTRUM

1.00 .99 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90

1960.0 1960.5 1961.0 1961.5 1962.0 1962.5 1963.0 1963.5 1964.0 1964.5 1965.0 1965.5 1966.0 1966.5 1967.0 1967.5 1968.0 1968.5 1969.0 1969.5 1970.0

1970.0 1970.5 1971.0 1971.5 1972.0 1972.5 1973.0 1973.5 1974.0 1974.5 1975.0 1975.5 1976.0 1976.5 1977.0 1977.5 1978.0 1978.5 1979.0 1979.5 1980.0

1980.0 1980.5 1981.0 1981.5 1982.0 1982.5 1983.0 1983.5 1984.0 1984.5 1985.0 1985.5 1986.0 1986.5 1987.0 1987.5 1988.0 1988.5 1989.0 1989.5 1990.0

1990.0 1990.5 1991.0 1991.5 1992.0 1992.5 1993.0 1993.5 1994.0 1994.5 1995.0 1995.5 1996.0 1996.5 1997.0 1997.5 1998.0 1998.5 1999.0 1999.5 2000.0

TELLURIC LINES REMOVED SUBJECTIVELY
COMPUTED SOLAR SPECTRUM INSERTED UNDER
STRONGEST TELLURIC FEATURES

RESIDUAL IRRADIANCE SPECTRUM
FTS SCAN 80
VACUUM WAVELENGTHS
GRAVITATIONAL REDSHIFT NOT REMOVED
DISPERSION .00607506 CM-1